

RNA inhibitor 合成报告单

客户姓名:			
客户编号:	MicroRNA inhibitor N.C.		
订货日期:			
序列 (5' to 3'):	CAGUACUUUUGUGUAGUACAA		
包装:	1 OD ₂₆₀ /管		
纯化方式:	HPLC		
修饰方式:	5'	3'	其他方式: 全甲氧修饰
订货总量:	OD		
形态:	减压离心干燥品, 制品干燥于管底, 为干粉状		
溶液配制:	为配制成 20 μ M 溶液, 需要在每一管中加入	250 μ L	DEPC 水
储存条件:	-15°C 以下干粉保存 6 个月, 建议 3 个月内使用。		
附送:	1 mL DEPC 水		
GEL PHOTO:			
结论:	符合企业标准要求		

1. 合成仪合成的序列与报告单上序列一致, 如果本报告单上打印的序列与您提供的序列不同, 请立即与我们联系。
2. 使用前请参阅背面的使用说明。

本公司通过 ISO 9001、ISO 13485 质量管理体系认证

RNA 合成报告单使用说明

1. RNA Oligo 的量是以 OD₂₆₀ 为单位来计算的, 这是指在 1ml 广程标准比色皿中, 260nm 波长下吸光度为 1 A₂₆₀ 的 oligo 溶液定义为 1 OD₂₆₀ 单位, 根据此定义 1 OD₂₆₀ 约相当于 33μg 的 RNA Oligo, 您可根据此数据和您的 RNA Oligo 分子量计算得到摩尔数以计算不同摩尔浓度的溶液。
2. siRNA 和双链 miRNA mimic 的平均分子量约为 13300, 单链 miRNA mimic/inhibitor 的平均分子量约为 6650。
3. siRNA oligo 的 OD、nmol 和质量间有精确的公式可以计算, 但一般情况下, 对于一个 21 bp 的双链 RNA oligo, 有如下简单关系: 1 OD duplex ≈ 2.5 nmol ≈ 33 μg, 对于一个单链 RNA oligo, 1 OD ≈ 5 nmol ≈ 33 μg。
4. 需要浓度 20 μM 的样品, 如何计算重悬 siRNA 缓冲液的量? 您购买了 1 OD 的双链 siRNA, 想溶解为 20 μM 的样品。应该使用 125 μL 附送的 DEPC 水去重悬 1 OD 的 siRNA, 溶解后为 20 μM 的样品。对于单链产品, 使用 250 μL 的 DEPC 水重悬 1 OD 的 oligo, 溶解后为 20 μM 的样品。
5. 由于 RNA Oligo 呈很轻的干粉状附在管壁上, 打开时极易散失, 所以打开管子前最好先在 3000-4000 转/分钟的转速下离心 1 分钟, 然后再慢慢打开管盖, 溶解时请加足量 DEPC 水后盖上管盖, 振荡溶解。
6. 贮存和稳定性: GenePharma 建议在 -15°C 以下的环境中冻干存贮, 避免多次冻融处理。GenePharma 保证在上述条件下 RNA oligo 的稳定性可达到 6 个月。
7. 荧光标记的 RNA, 如 FAM、Cy3、Cy5 等标记的 Oligo 因为对光敏感, 必须避光保存。
8. GenePharma 设计的双链 siRNA 有以下特征: 正义链 21 碱基是 19 个碱基的靶序列加 3'端 2 个碱基的悬头 TT; 反义链 21 碱基是 19 个与正义链互补的碱基, 3'端加 2 个碱基的悬头 TT。

如有疑问欢迎垂询

上海电话: 021-51320195

E-mail: support@genepharma.com

苏州电话: 0512-86668828

E-mail: szsupport@genepharma.com

<http://www.genepharma.com>



产品说明书

R005-V003B-20220721